



## Liste des plantes observées à : Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

Commune de MAIGNAUT-TAUZIA

Nombre de plantes observées 209

Bords de chemins, bois de chênes et châtaigniers, chemin en sous-bois frais à humide, bords de cultures, intérieur du village ...

### Aceraceae

*Acer campestre L. subsp. campestre*

bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, neutrophiles

- Érable champêtre

### Alismataceae

*Alisma plantago-aquatica L.*

roselières médioeuropéennes pionnières

- Alisma Plantain d'eau

### Apiaceae

*Eryngium campestre L.*

pelouses basophiles médioeuropéennes

- Panicaut champêtre

*Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium*

ourlets externes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques

- Berce commune

*Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis*

annuelles commensales des moissons basophiles, mésothermes

- Torilis des champs

*Torilis nodosa (L.) Gaertn. subsp. nodosa*

friches annuelles, subnitrophiles, mésoméditerranéennes

- Torilis nouveau

### Aquifoliaceae

*Ilex aquifolium L.*

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens, psychrophiles, mésotrophiles, acidophiles

- Houx

### Araceae

*Arum italicum Mill.*

sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles

- Arum d'Italie

### Araliaceae

*Hedera helix L.*

bois caducifoliés médioeuropéens

- Lierre

### Asteraceae

*Achillea millefolium L.*

prairies médioeuropéennes, mésohydriques

- Achillée Millefeuille

*Andryala integrifolia L.*

friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, estivales, mésohydriques

- Andryale à feuilles entières

*Arctium lappa L.*

friches vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, héliophiles

- Bardane commune

*Artemisia vulgaris L.*

friches vivaces xérophiles européennes

- Armoise Citronnelle



## Liste des plantes observées à : Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

<i>Bellis perennis</i> L. ■ Pâquerette	prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées
<i>Centaurea jacea</i> L. ■ Centaurée Jacée	prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, mésothermes, planitiaires à montagnardes
<i>Centaurea nigra</i> L. <i>subsp. nigra</i> ■ Centaurée noire	pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiales-collinéennes, psychroatlantiques
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. ■ Cirse des champs	friches vivaces xérophiiles européennes
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. ■ Cirse aranéeux	friches vivaces xérophiiles, médioeuropéennes, mésothermes
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. <i>subsp. vulgare</i> ■ Cirse à feuilles lancéolées	friches vivaces xérophiiles, médioeuropéennes
<i>Eupatorium cannabinum</i> L. <i>subsp. cannabinum</i> ■ Eupatoire à feuilles de Chanvre	mégaphorbiaies planitiales-collinéennes, eutrophiles
<i>Hieracium vulgatum</i> Fr. ■ Épervière commune	ourlets acidophiles médioeuropéens
<i>Hypochaeris radicata</i> L. <i>subsp. radicata</i> ■ Porcelle enracinée	pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles (sables), médioeuropéennes à
<i>Lactuca serriola</i> L. ■ Laitue sauvage	friches annuelles, subnitrophiles, médioeuropéennes
<i>Lapsana communis</i> L. <i>subsp. communis</i> ■ Lampsane commune	annuelles pionnières des clairières et lisières médioeuropéennes, psychrophiles, hémisciaphiles
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. <i>subsp. vulgare</i> ■ Marguerite	prairies médioeuropéennes, mésohydriques
<i>Matricaria discoidea</i> DC. ■ Matricaire odorante	tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles, mésothermes
<i>Matricaria perforata</i> Mérat ■ Camomille inodore	annuelles commensales des cultures
<i>Picris echioides</i> L. ■ Picride fausse Vipérine	friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, estivales, xérophiiles
<i>Picris hieracioides</i> L. <i>subsp. hieracioides</i> ■ Picride fausse Épervière	friches vivaces mésoxérophiiles, médioeuropéennes
<i>Senecio jacobaea</i> L. <i>subsp. jacobaea</i> ■ Sénéçon de Jacob	friches vivaces mésoxérophiiles, médioeuropéennes
<i>Senecio vulgaris</i> L. <i>subsp. vulgaris</i> ■ Sénéçon commun	annuelles commensales des cultures



## Liste des plantes observées à :

### Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

*Sonchus asper* (L.) Hill subsp. *asper*

- Laiteron épineux

annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, médioeuropéennes, mésothermes

*Tragopogon porrifolius* L. subsp. *porrifolius*

- Salsifis à feuilles de Poireau

prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, thermoatlantiques, fauchées

*Tragopogon pratensis* L. subsp. *pratensis*

- Salsifis des prés

prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, mésothermes, planitiales à montagnardes

#### Boraginaceae

*Lithospermum purpureocaeruleum* L.

- Grémil bleu pourpre

ourlets basophiles médioeuropéens

*Myosotis arvensis* Hill subsp. *arvensis*

- Myosotis des champs

friches annuelles européennes, subnitrophiles

*Pulmonaria affinis* Jord.

- Pulmonaire semblable

ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, planitiales-collinéens

#### Brassicaceae

*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande

- Alliaire

annuelles pionnières des clairières et lisières médioeuropéennes, psychrophiles, hémisciaphiles

*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.

- Arabette de Thalius

annuelles pionnières des clairières, lisières et éboulis européens

*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. subsp. *bursa-pastoris*

- Bourse-à-pasteur

annuelles commensales des cultures

*Diplotaxis eruroides* (L.) DC.

- Diplotaxis fausse Roquette

annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, méditerranéennes

*Lepidium didymum* L.

- Corne-de-cerf à deux lobes

tonsure annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles

*Lepidium draba* L.

- Cardaire Drave

friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, médioeuropéennes, thermophiles

*Myagrum perfoliatum* L.

- Myagre perfolié

annuelles commensales des cultures basophiles

*Nasturtium officinale* R.Br.

- Cresson de fontaine

cressonnières flottantes holarctiques

*Sinapis alba* L. subsp. *alba*

- Moutarde blanche

annuelles commensales des cultures basophiles

*Sisymbrium officinale* (L.) Scop.

- Herbe aux chantres

friches annuelles, subnitrophiles, médioeuropéennes

#### Caprifoliaceae

*Lonicera periclymenum* L. subsp. *periclymenum*

- Chèvrefeuille des bois

fouffrés arbustifs médioeuropéens, planitiales-collinéens à montagnard, psychrophiles,



## Liste des plantes observées à : Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

*Sambucus ebulus* L.

- Hièble

ourlets externes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques

*Sambucus nigra* L.

- Grand Sureau

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaux-collinéens à montagnard, psychrophiles,

*Viburnum lantana* L.

- Lantane

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaux-montagnards, mésotrophiles, basophiles

*Viburnum tinus* L.

- Laurier-tin

matorrals méditerranéens, sciaphiles

### Caryophyllaceae

*Arenaria serpyllifolia* L. subsp. *serpyllifolia*

- Sabline à feuilles de Serpolet

tonsures annuelles basophiles, européennes

*Cerastium glomeratum* Thuill.

- Céraiste aggloméré

annuelles commensales des cultures acidophiles, mésohygrophiles

*Minuartia hybrida* (Vill.) Schischk. subsp. *tenuifolia* (L.) Kerguélén

- Minuartie à feuilles étroites

tonsures annuelles acidophiles, européennes

*Sagina apetala* Ard. subsp. *apetala*

- Sagine apétale

*Sagina apetala* Ard. subsp. *erecta* (Hornem.) F.Herm.

- Sagine dressée

*Silene latifolia* Poir. subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet

- Compagnon blanc

friches vivaces xérophiles européennes

*Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*

- Silène commun

friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, médioeuropéennes, thermophiles

*Stellaria holostea* L.

- Stellaire holostée

ourlets externes acidophiles médioeuropéens

*Stellaria media* (L.) Vill. subsp. *media*

- Morgeline

annuelles commensales des cultures

### Celastraceae

*Euonymus europaeus* L.

- Fusain

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaux-montagnards, méso à eutrophiles

### Chenopodiaceae

*Blitum virgatum* L.

- Épinard-fraise en baguette

friches annuelles, nitrophiles, thermophiles, estivales, mésohydriques

*Chenopodium album* L. subsp. *album*

- Ansérine blanche

annuelles commensales des cultures



## Liste des plantes observées à : Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

### Convolvulaceae

*Convolvulus arvensis* L. subsp. *arvensis*

friches vivaces rudérales pionnières,  
mésoxérophiles, médioeuropéennes, psychrophiles

- Liseron des champs

### Cornaceae

*Cornus sanguinea* L. subsp. *sanguinea*

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaux-  
montagnards, méso à eutrophiles

- Cornouiller sanguin

### Corylaceae

*Carpinus betulus* L.

bois caducifoliés médioeuropéens

- Charme

*Corylus avellana* L.

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaux-  
montagnards, méso à eutrophiles

- Coudrier

### Cupressaceae

*Juniperus communis* L. subsp. *communis*

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaux-  
montagnards, mésotrophiles, basophiles

- Genévrier commun

### Cyperaceae

*Carex cuprina* (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.

prairies européennes, hygrophiles

- Laïche couleur de Renard

*Carex divulsa* Stokes subsp. *divulsa*

ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques,  
des clairières

- Laïche à épis séparés

*Carex flacca* Schreb. subsp. *flacca*

pelouses basophiles médioeuropéennes  
occidentales, mésohygrophiles marnicoles,

- Laïche flasque

*Carex pilulifera* L. subsp. *pilulifera*

pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaux-  
collinéennes

- Laïche à boulettes

*Carex remota* L.

sources acidophiles, sciaphiles

- Laïche à épis espacés

*Carex spicata* Huds.

ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques,  
des clairières

- Laïche en épis

*Carex sylvatica* Huds. subsp. *sylvatica*

sous-bois herbacés médioeuropéens, planitiaux à  
montagnards

- Laïche des bois

### Dennstaedtiaceae

*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn subsp. *aquilinum*

ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens

- Fougère-aigle

### Dioscoreaceae

*Tamus communis* L.

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaux-  
collinéens, thermophiles

- Herbe aux femmes battues

### Dipsacaceae

*Dipsacus fullonum* L.

mégaphorbiaies planitiaux-collinéennes,  
eutrophiles, médioeuropéennes

- Cabaret-des-oiseaux



## Liste des plantes observées à : Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

### Equisetaceae

*Equisetum telmateia* Ehrh.

mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes,  
mésotrophiles, neutrophiles

- Grande Prêle

### Ericaceae

*Erica cinerea* L.

landes atlantiques thermophiles

- Bruyère cendrée

### Euphorbiaceae

*Euphorbia amygdaloides* L. subsp. *amygdaloides*

sous-bois herbacés médioeuropéens, planitiaires à  
montagnards

- Euphorbe à feuilles d'Amandier

*Euphorbia dulcis* L. subsp. *dulcis*

- Euphorbe douce

*Euphorbia helioscopia* L.

annuelles commensales des cultures sarclées  
basophiles, médioeuropéennes, mésothermes

- Euphorbe Réveille-matin

*Euphorbia villosa* Waldst. & Kit. ex Willd.

mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes,  
mésotrophiles, neutrophiles, atlantiques

- Euphorbe poilue

*Mercurialis annua* L. subsp. *annua*

annuelles commensales des cultures

- Mercuriale annuelle

### Fabaceae

*Cytisus scoparius* (L.) Link subsp. *scoparius*

fourrés arbustifs européens pionniers, acidophiles,  
xérophiles

- Genêt à balais

*Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler subsp. *montanus* (Bernh.) Bässler

ourlets externes acidophiles médioeuropéens

- Gesse des montagnes

*Lathyrus pratensis* L. subsp. *pratensis*

ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques

- Gesse des prés

*Lotus corniculatus* L. subsp. *corniculatus*

pelouses basophiles médioeuropéennes  
occidentales, mésohydriques

- Lotier commun

*Medicago arabica* (L.) Huds.

annuelles commensales des cultures basophiles

- Luzerne d'Arabie

*Medicago lupulina* L. subsp. *lupulina*

pelouses basophiles médioeuropéennes  
occidentales, mésohydriques

- Luzerne Lupuline

*Medicago sativa* L. subsp. *sativa*

friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes

- Luzerne cultivée

*Melilotus officinalis* Lam.

friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes

- Mélilot jaune

*Ononis spinosa* L. subsp. *maritima* (Dumort. ex Piré) P.Fourn.

- Bugrane maritime



## Liste des plantes observées à : Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaux-collinéens, eutrophiles
■ Acacia	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	friches annuelles, subnitrophiles, médioeuropéennes
■ Petit Trèfle jaune	
<i>Trifolium medium</i> L. <i>subsp. medium</i>	ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques
■ Trèfle flexueux	
<i>Trifolium pratense</i> L. <i>subsp. pratense</i>	prairies européennes
■ Trèfle commun	
<i>Trifolium repens</i> L. <i>subsp. repens</i>	prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées
■ Trèfle blanc	
<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.	annuelles commensales des cultures basophiles
■ Vesce de Bithynie	
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	annuelles commensales des cultures acidophiles, mésohydriques, mésothermes
■ Vesce hérissée	
<i>Vicia sativa</i> L. <i>subsp. sativa</i>	friches annuelles européennes
■ Vesce commune	
<i>Vicia sepium</i> L.	ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques
■ Vesce des haies	
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	annuelles commensales des cultures acidophiles, mésohydriques, mésothermes
■ Cicérole	

### Fagaceae

<i>Castanea sativa</i> Mill.	bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles
■ Châtaignier	
<i>Quercus petraea</i> Liebl. <i>subsp. petraea</i>	bois caducifoliés médioeuropéens
■ Chêne Rouvre	
<i>Quercus robur</i> L. <i>subsp. robur</i>	bois caducifoliés médioeuropéens
■ Chêne pédonculé	

### Geraniaceae

<i>Geranium dissectum</i> L.	annuelles commensales des cultures basophiles
■ Géranium à feuilles découpées	
<i>Geranium molle</i> L. <i>subsp. molle</i>	annuelles pionnières des clairières et lisières européennes
■ Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium robertianum</i> L. <i>subsp. robertianum</i>	annuelles pionnières des clairières, lisières et éboulis européens
■ Géranium Herbe à Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	annuelles pionnières des clairières et lisières européennes
■ Géranium à feuilles rondes	



## Liste des plantes observées à :

### Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

#### Hyacinthaceae

*Muscari comosum* (L.) Mill.

friches vivaces rudérales pionnières,  
mésoxérophiles, subméditerranéennes

- Muscari à toupet

*Ornithogalum pyrenaicum* L.

sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles

- Ornithogale des Pyrénées

#### Hypericaceae

*Hypericum androsaemum* L.

lisières et clairières vivaces médioeuropéennes,  
eutrophiles, mésohygrophiles

- Androsème

*Hypericum perforatum* L.

friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

- Millepertuis commun

#### Iridaceae

*Gladiolus italicus* Mill.

friches vivaces rudérales pionnières,  
mésoxérophiles, subméditerranéennes

- Glaïeul d'Italie

#### Juncaceae

*Juncus conglomeratus* L.

prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles,  
atlantiques

- Jonc aggloméré

*Juncus effusus* L.

prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles,  
atlantiques

- Jonc diffus

*Juncus inflexus* L.

prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau  
topographique moyen, psychrophiles, pâturées,

- Jonc arqué

#### Lamiaceae

*Ajuga reptans* L.

prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées

- Bugle rampante

*Mentha aquatica* L. subsp. *aquatica*

prairies européennes, hygrophiles longuement  
inondables

- Menthe aquatique

*Mentha suaveolens* Ehrh. subsp. *suaveolens*

prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau  
topographique moyen, thermophiles, pâturées

- Menthe à feuilles rondes

*Origanum vulgare* L. subsp. *vulgare*

ourlets basophiles médioeuropéens

- Marjolaine sauvage

*Prunella vulgaris* L. subsp. *vulgaris*

prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées

- Brunelle commune

*Stachys annua* (L.) L. subsp. *annua*

annuelles commensales des cultures basophiles

- Épiaire annuelle

*Stachys officinalis* (L.) Trévis. subsp. *officinalis*

ourlets externes acidophiles médioeuropéens

- Bétoine officinale

*Stachys sylvatica* L.

lisières et clairières vivaces médioeuropéennes,  
eutrophiles, mésohygrophiles

- Épiaire des bois





## Liste des plantes observées à : Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

*Teucrium scorodonia* L. subsp. *scorodonia* ourlets externes acidophiles médioeuropéens

- Germandrée Scorodoine

### Lemnaceae

*Lemna minor* L. voiles annuels de lentilles d'eau holarctiques

- Petite Lenticule

### Linaceae

*Linum bienne* Mill. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, thermophiles

- Lin à feuilles étroites

### Malvaceae

*Malva sylvestris* L. subsp. *sylvestris* friches vivaces xérophiles européennes

- Grande Mauve

### Oleaceae

*Fraxinus excelsior* L. subsp. *excelsior* bois caducifoliés médioeuropéens

- Frêne commun

*Ligustrum vulgare* L. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles

- Troène commun

### Onagraceae

*Epilobium hirsutum* L. mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes

- Épilobe à grandes fleurs

*Epilobium tetragonum* L. subsp. *tetragonum* mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes

- Épilobe à quatre angles

### Orchidaceae

*Anacamptis laxiflora* (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. *laxiflora* prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, thermoatlantiques, fauchées

- Orchis à fleurs lâches

*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. subsp. *pyramidalis* pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques

- Anacamptis pyramidal

*Ophrys apifera* Huds. subsp. *apifera*

- Ophrys Abeille

*Ophrys scolopax* Cav. subsp. *scolopax* pelouses basophiles mésoméditerranéennes, mésoxérophiles

- Ophrys Bécasse

*Serapias vomeracea* (Burm.f.) Briq. pelouses acidophiles méditerranéennes

- Sérapias à labelle allongé

### Orobanchaceae

*Orobanche picridis* F.W.Schultz friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes

- Orobanche de la Picride

### Papaveraceae

*Fumaria officinalis* L. subsp. *officinalis* annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, médioeuropéennes, mésothermes

- Fumeterre officinale



## Liste des plantes observées à : Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

*Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas*

annuelles commensales des cultures basophiles

- Coquelicot

### Plantaginaceae

*Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata*

prairies européennes

- Plantain étroit

*Plantago major L. subsp. major*

prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées, surpiétinées, planitiaires à montagnardes

- Grand Plantain

### Poaceae

*Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum*

pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines

- Flouve odorante

*Avena sativa L. subsp. sativa*

friches annuelles européennes, subnitrophiles

- Avoine cultivée

*Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. subsp. sylvaticum*

ourlets internes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques

- Brachypode des bois

*Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus*

- Brome fausse Orge

*Bromus sterilis L. [nom. cons.]*

friches annuelles, subnitrophiles, médioeuropéennes

- Brome stérile

*Cynodon dactylon (L.) Pers.*

prairies méditerranéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, pâturées

- Chiendent Pied-de-poule

*Dactylis glomerata L. subsp. glomerata*

prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées

- Dactyle

*Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea*

prairies européennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, thermophiles

- Fétuque élevée

*Holcus lanatus L.*

prairies européennes

- Houlque laineuse

*Hordeum murinum L. subsp. murinum*

friches annuelles, subnitrophiles, médioeuropéennes

- Orge des rats

*Lolium perenne L.*

prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées

- Ray-grass anglais

*Melica uniflora Retz.*

sous-bois herbacés médioeuropéens, acidophiles, planitiaires-collinéens, mésothermes

- Mélisque à une fleur

*Phleum pratense L. subsp. pratense*

prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées

- Fléole des prés

*Poa annua L.*

tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles

- Pâturin annuel



## Liste des plantes observées à : Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

<i>Poa pratensis</i> L.	prairies européennes
■ Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>	prairies européennes
■ Gazon d'Angleterre	
<b>Polygonaceae</b>	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	annuelles commensales des cultures
■ Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, eurasiatiques
■ Persicaire	
<i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>acetosa</i>	prairies européennes
■ Grande Oseille	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	prairies européennes, hygrophiles
■ Oseille agglomérée	
<i>Rumex crispus</i> L.	prairies européennes, hygrophiles
■ Oseille crépue	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	lisières et clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohygrophiles
■ Oseille sanguine	
<b>Primulaceae</b>	
<i>Anagallis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	annuelles commensales des cultures
■ Mouron des champs	
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	annuelles commensales des moissons basophiles, mésothermes
■ Mouron bleu	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	prairies européennes, hygrophiles longuement inondables
■ Lysimaque Nummulaire	
<b>Ranunculaceae</b>	
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées
■ Renoncule âcre	
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	annuelles commensales des cultures basophiles
■ Chausse-trape des blés	
<i>Ranunculus repens</i> L.	prairies européennes, hygrophiles
■ Renoncule rampante	
<b>Rosaceae</b>	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i>	ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques, planitiaires-collinéens
■ Aigremoine Eupatoire	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	annuelles commensales des cultures acidophiles, mésohydriques, mésothermes
■ Alchémille des champs	

## Liste des plantes observées à :

### Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaux-montagnards, méso à eutrophiles
■ Aubépine à un style	
<i>Geum urbanum</i> L.	friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques
■ Benoîte commune	
<i>Mespilus germanica</i> L.	fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaux-collinéens, psychophiles, mésotrophiles, acidophiles
■ Néflier	
<i>Potentilla reptans</i> L.	prairies européennes, hygrophiles
■ Potentille rampante	
<i>Prunus spinosa</i> L.	fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaux-montagnards, méso à eutrophiles
■ Épine noire	
<i>Rosa canina</i> L.	fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaux-montagnards, méso à eutrophiles
■ Églantier des chiens	
<i>Rubus fruticosus</i> L.	ourlets stabilisés de clairières acidophiles, médioeuropéens, planitiaux-collinéens
■ Ronce commune	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	pelouses basophiles médioeuropéennes
■ Petite Pimprenelle	
<i>Sorbus domestica</i> L.	bois caducifoliés médioeuropéens, basophiles, oligotrophiles
■ Cormier	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	bois caducifoliés médioeuropéens, basophiles, oligotrophiles
■ Alisier des bois	

#### Rubiaceae

<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	ourlets externes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques
■ Croisette commune	
<i>Galium aparine</i> L. <i>subsp. aparine</i>	friches annuelles européennes
■ Gaillet accrochant	
<i>Galium mollugo</i> L. <i>subsp. mollugo</i>	prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées
■ Caille-lait blanc	
<i>Rubia peregrina</i> L. <i>subsp. peregrina</i>	ourlets basophiles médioeuropéens, xérophiles
■ Garance sauvage	
<i>Sherardia arvensis</i> L.	
■ Rubéole	

#### Ruscaceae

<i>Ruscus aculeatus</i> L.	sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles
■ Fragon faux Houx	

#### Salicaceae

<i>Populus tremula</i> L.	bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaux-collinéens, acidoclines
■ Peuplier Tremble	



## Liste des plantes observées à :

### Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

*Populus x canadensis* Moench

bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles

- Peuplier du Canada

*Salix alba* L. subsp. *alba*

bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles, médioeuropéens

- Osier blanc

#### Scrophulariaceae

*Chaenorrhinum minus* (L.) Lange

annuelles commensales des moissons basophiles, mésothermes

- Petite Linaire

*Kickxia elatine* (L.) Dumort. subsp. *elatine*

annuelles commensales des moissons basophiles, mésothermes

- Linaire Élatine

*Veronica arvensis* L.

tonsures annuelles basophiles, sabulicoles, mésohydriques

- Véronique des champs

*Veronica chamaedrys* L. subsp. *chamaedrys*

ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques

- Véronique Petit-chêne

*Veronica hederifolia* L. subsp. *hederifolia*

annuelles commensales des cultures acidophiles, mésohydriques, mésothermes

- Véronique à feuilles de Lierre

*Veronica officinalis* L.

ourlets acidophiles médioeuropéens

- Véronique officinale

*Veronica persica* Poir.

annuelles commensales des cultures basophiles

- Véronique commune

#### Solanaceae

*Datura stramonium* L.

friches annuelles européennes, subnitrophiles

- Datura officinal

#### Typhaceae

*Typha latifolia* L.

roselières européennes

- Massette à larges feuilles

#### Ulmaceae

*Ulmus minor* Mill. subsp. *minor*

bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaire-collinéens

- Orme à feuilles luisantes

#### Urticaceae

*Urtica dioica* L.

friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohydrophiles

- Grande Ortie

#### Verbenaceae

*Verbena officinalis* L.

friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes

- Verveine officinale

#### Violaceae

*Viola canina* L. subsp. *canina*

pelouses acidoclines médioeuropéennes, planitiaire-collinéennes, psychroatlantiques

- Violette des chiens



## Liste des plantes observées à :

### Ballade sur la commune de MAIGNAUT-TAUZIA

#### Viscaceae

*Viscum album L. subsp. album*

bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles

- Gui des feuillus